

PSITÁCIDOS DE VENEZUELA



Aratinga pertinax



Aratinga solstitialis

PERICO CARA SUCIA

Aratinga pertinax

TIERRAS BAJAS EN TODA VENEZUELA,
ISLAS MARGARITA, COCHE, CUBAGUA Y LA TORTUGA

25 cm

Es el perico venezolano más común, llamado cara sucia por su coloración frontal parda, que varía sustancialmente entre las catorce subespecies conocidas, hasta llegar a colores amarillos y naranjas. La mitad de las subespecies habitan en Venezuela, dos de las cuales, ambas insulares, están amenazadas. Frecuenta una gran diversidad de ambientes, desde semidesiertos hasta bosques abiertos, por debajo de los 1.600 msnm. Hace sus nidos en el interior de grandes termiteros o comejenes. Norte de Suramérica, desde Panamá hasta Brasil.

PERICO DEL SOL

Aratinga solstitialis

SURESTE DE BOLÍVAR

33 cm

Su presencia en Venezuela es marginal. Solo se conoce por avistamientos en las cercanías de Santa Elena de Uairén, sabanas vecinas al Roraima, y zonas fronterizas aledañas. Su impresionante coloración con gradaciones de amarillo a rojo, que contrasta con los diversos verdes de las alas y la cola, hacen de esta una de las aves favoritas de los criadores de loros. Anida en cavidades en las palmas de moriche. Restringido desde Guyana central al noreste de Brasil, con avistamientos en Surinam y Venezuela.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR
CARACAS 2012

COORDINACIÓN EDITORIAL: GISELA GOYO
CONCEPCIÓN: MERCEDES MADRIZ, FRANKLIN ROJAS y ÁLVARO SOTILLO
ILUSTRACIONES: MERCEDES MADRIZ
ASESORÍA e INVESTIGACIÓN: FRANKLIN ROJAS SUÁREZ (PROVITA)
COLABORACIÓN: MUSEO DE HISTORIA NATURAL LA SALLE
DISEÑO GRÁFICO: ÁLVARO SOTILLO y GABRIELA FONTANILLAS
CORRECCIÓN: ALBERTO MÁRQUEZ
IMPRESIÓN: EXLIBRIS
DEPÓSITO LEGAL: CT 259201227