



*Callicore pitheas*



*Callicore cyllene aphidna*



*Callicore pitheas*

(LATREILLE, 1813)

TÁCHIRA · ZULIA · OCCIDENTE hasta MIRANDA

Esta es la especie de *Callicore* más común en el norte de Venezuela, donde se ha reportado en Táchira, Zulia, y en todos los estados entre el occidente del país y Miranda. Se encuentra regularmente en jardines, parques, bosques de galería o en caminos que bordean trechos de bosque seco.

Allí se posan en el suelo para chupar agua. Cuando son acosadas escapan rápidamente y se posan en troncos de árboles cercanos, con la cabeza hacia abajo, o sobre una hoja. La hembra se parece mucho al macho, pero exhibe colores algo más pálidos.

La larva se alimenta de hojas de *Serjania* y *Paullinia*.

*Callicore cyllene aphidna*

(HEWITSON, 1869)

BARINAS · YARACUY · CARABOBO · MIRANDA

Esta subespecie ha sido recolectada en los estados Barinas, Yaracuy, Carabobo y Miranda. Es una mariposa poco común. Macho y hembra se parecen, pero los colores del macho son más brillantes. La planta hospedera de la larva es un arbusto del género *Allophylus* (familia Sapindaceæ).